

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 19-3-76166012

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

### SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL :

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

50 francs

1976

n° 7

Imprimerie de la Station "Languedoc-Roussillon" - Directeur-gérant : L. BOUQUET

#### POIRIERS -

##### TAVELURE

Dans de nombreuses situations le stade C3 est atteint, le traitement conseillé doit être généralisé afin d'assurer la protection des jeunes organes.

##### PSYLLES

Dès repérage des larves de psylles, il est recommandé de traiter à l'aide d'une des matières actives suivantes : lindane, azinphos methyl, methidathion, monocrotophos.

#### POMMIERS -

##### TAVELURE (régions 1.2.8.9.12.14.19 et 20)

La maturité des périthèces a été observée et les ascospores ont été décelées au laboratoire. Certaines variétés atteignent les stades sensibles C3 - D, dans de telles situations, il convient d'effectuer un traitement.

N.B. - Les produits efficaces contre les deux tavelures précitées sont signalés dans la Revue Phytoma de février 1976. Les produits cupriques sont utilisables en cette saison sur pommier. Par contre sur pommier, et notamment sur la variété Golden delicious, il est préférable de choisir une substance fongicide moins agressive.

##### OIDIUM

Dès le stade C, les premières manifestations de la maladie peuvent être observées sur variétés sensibles. Dans les vergers attaqués l'an dernier, une intervention est nécessaire aux stades C - C3 - D, à l'aide d'un anti-oidium à base de soufre de préférence, que le pommier supporte parfaitement aux stades cités.

#### ARBRES FRUITIERS A NOYAU -

##### MONILIA

Renouveler la protection des fleurs. Des manifestations de la maladie sont signalées.

#### NECTARINES -

##### THRIPS

Le traitement le plus important est celui appliqué à la chute des pétales. Pour éviter tout accident vis-à-vis des abeilles, on doit effectuer cette application insecticide après la floraison. Le metamidophos (TAMARON), grâce à son mode d'action, permet cette intervention tardive.

Le lindane peut également être utilisé.

S'abstenir de tout traitement insecticide pendant la floraison.

#### ABRICOTIER -

##### OIDIUM

Renouveler la protection 12 à 15 jours après la première application, soit à l'aide d'un soufre, soit à l'aide de dinitrophényl crotonate (KARATHANE).

#### CERISIERS -

##### TEIGNE

Pour éviter les dégâts de ce ravageur, sur les arbres habituellement attaqués et non traités, il convient d'effectuer actuellement un traitement à l'aide d'un oléoparathion, auquel on ajoutera éventuellement un fongicide pour lutter contre le Monilia.

LE CHEF DE CIRCONSCRIPTION,

LAGAUDE

L'INGENIEUR

TISSOT

Tirage du 17 mars 1976

1400 exemplaires

n° CFP 531 AD

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles

Place Chaptal - Montpellier

Le Directeur : P. JOURNET

P170